

Año académico 2015 - 2016  
Departamento de Salud del Estado de Indiana  
Requisitos de Vacunación de la Escuela  
*Actualizado en noviembre de 2014*

<b>De 3 a 5 años</b>	3 Hep B (Hepatitis B) 4 DTaP (Difteria, tétanos y tos ferina) 3 Polio (Poliomelitis inactivada) 1 MMR (Sarampión, paperas, rubéola) 1 Varicela	
<b>Jardín de infantes y 1<sup>er</sup> grado</b>	3 Hep B 5 DTaP 4 Polio 2 MMR	2 Varicela 2 Hep A (Hepatitis A)
<b>De 2.º a 5.º grado</b>	3 Hep B 5 DTaP 4 Polio 2 MMR	2 Varicela
<b>De 6.º a 11.º grado</b>	3 Hep B 5 DTaP 4 Polio 2 MMR	2 Varicela 1 Tdap (Tétano y pertusis) 1 MCV4 (Meningocócica conjugada)
<b>12.º grado</b>	3 Hep B 5 DTaP 4 Polio 2 MMR	2 Varicela 1 Tdap 2 MCV4

**Hep B** La edad mínima para la 3.ª dosis de Hepatitis B es 24 semanas de edad.

**DTaP** Cuatro dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4.ª dosis se administró en el 4.º cumpleaños del niño o después de esa fecha.

**Polio** Tres dosis de polio son aceptables para todos los niveles de grados si la tercera dosis se administró en el 4.º cumpleaños o después de esa fecha, o bien, al menos 6 meses después de la dosis anterior con un solo tipo de vacuna utilizada (todas OPV o todas IPV). Para los alumnos que estén en el jardín de infantes hasta 5.º grado, la dosis final se debe administrar en el 4.º cumpleaños o después de esa fecha, y debe administrarse **al menos 6 meses** después de la dosis anterior. Para los alumnos que estén en el jardín de infantes hasta 5.º grado, la dosis final debe administrarse en el 4.º cumpleaños o después de esa fecha, y debe administrarse **al menos 6 meses** después de la dosis anterior.

**Vacunas vivas (MMR, Varicela y LAIV)** Las vacunas vivas que no se administran el mismo día se deben administrar con una diferencia mínima de 28 días. La segunda dosis debe repetirse si las dosis se administraron con una diferencia de menos de 28 días.

**Varicela** La documentación médica de los antecedentes de enfermedades, incluidos el mes y el año, es la prueba de inmunidad para los niños que ingresan en preescolar hasta 7.º grado. El informe de los padres sobre antecedentes de enfermedades es aceptable para los grados 8.º a 12.º.

**Tdap** No hay ningún intervalo mínimo desde la última dosis de Td.

**MCV4** Las personas que reciben la 1ª dosis en su 16º cumpleaños o después de esa fecha solo necesitan 1 dosis de MCV4.

**Hep A** El intervalo mínimo entre la 1.ª y la 2.ª dosis de Hepatitis A es de 6 meses calendario.

Para los niños que se han retrasado con su vacunación, consulte el "Programa de Actualización de Vacunas" del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de 2015, a fin de determinar las dosis de vacunación de forma adecuada. Para que una dosis sea válida, deben cumplirse todas las edades e intervalos mínimos para cada vacuna especificados según la Guía del CDC de 2015. Una copia de estas guías puede encontrarse en

<http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/>.